

OSTATNÍ POHLAVNĚ PŘENOSNÉ INFEKCE

MUDr. Helena Skálová
Ústav patologie

CHLAMYDIE:

Chlamydia trachomatis D-K

Chlamydia trachomatis L1-L3

Chlamydia trachomatis A-C

Další chlamydie

Chlamydia trachomatis D-K

- Symptomy: výtok, dysurie
- Často asymptomatické

- **Ženy:**
 - Serózní až hnisavá cervicitida
 - Endometritida, salpingitida, zánět pánevního peritonea
 - Komplikace: Extrauterinní gravidita, infertilita

- **Muži:**
 - Serózní až hnisavá urethritida
 - Epididymitida, prostatitida, proktitida

- Komplikace: Reiterův syndrom (urethritis, conjunctivitis, arthritis)

Chlamydia trachomatis L1-L3

Lymphogranuloma venereum:

- Bradavičnaté uzlíky na genitáliích
– brána infekce
- Infekce inguinálních a pánevních
lymfatických cév a uzlin
(nekrotizující granulomatózní
záněť) → píštěle, vředy, jizvení
- Lymfedém anogenitální oblasti
(elefantiáza)

Další onemocnění vyvolaná chlamydiemi

- **Trachom** (řecky zhrubění)
 - Chlamydia trachomatis A-C
 - Zánět spojivky
 - Endemický v Africe
 - Hlavní příčina slepoty celosvětově

- **Konjunktivitida**
(Ch. trachomatis D-K)

- **Atypická pneumonie**
(Ch. pneumoniae, Ch. psittaci)

HEMOPHILUS DUCREYI



Ulcus molle, chancroid

- Červená papula → pustula → bolestivý vřed a indurace na genitáliích a perineu (2 – 20 mm), snadno krvácí
- Často mnohočetné

- Muži: prepucium, glans
- Ženy: labia, perineum
- Jiné lokality: prsty, rty, tonzily

- Inguinální lymfangiopatie (bubo) → fistula

- Histologie:
nespecifický zánět,
G- bakterie (tyčky)

KLEBSIELLA GRANULOMATIS



Granuloma inguinale

- Endemické v Africe, Asii, Karibiku
- Malé, ulcerované papuly na labiích, vaginálním introitu, glans penis and preputiu
- Splývají ve větší plochy hypertrofické granulační tkáně, hnědočervené barvy
(ulcerovegetativní forma)
- Pomalu progredující, destruktivní
- Pomalé hojení
- Komplikace: zohavující jizvy, stenóza urethry
- Histologie: Donovanova tělíska
(bakterie v makrofázích)

TRICHOMONAS VAGINALIS



Trichomoniáza

- Akutní vaginitida
- Často společně s bakteriální vaginitidou
- Výtok, dysurie, svědění, bolest
- Bičíkovci v nátěru z výtoku
- Může způsobit předčasný porod
- Muži přenašeči, většinou bez příznaků